

NOUVELLES ACANTHACÉES ASIATIQUES,

PAR M. RAYMOND BENOIST.

Rungia hirpex nov. sp.

Herba caulibus diffusis, fasciis duabus pubescentibus oppositis longitudinaliter natis, præterea glabris. Folia petiolata, ovalia vel oblonga, ad basim acuta et in petiolum decurrentia, ad apicem acuminata, pilis raris sparsis in nervis et in margine vestita. Flores in spicis caulem et ramos terminantibus congregati. Bractæ oppositæ quadrifariam dispositæ, cujusque paris una sterilis, altera fertilis, lanceolato-lineares, oblusæ, margine anguste scarioso et ciliolato. Bracteolæ oblongo-lanceolatæ fere hyalinæ, margine ciliolato. Sepala linearia, acuta, glabra, fere ad basim libera. Corollæ tubus cylindricus, labium inferius trilobum, superius triangulare, apice subtruncato. Stamina duo ad faucem inserta, antheræ toculo infero ad basim breviter calcarato. Ovarium glabrum. Capsula glabra.

Feuilles longues de 2,5-9 cm., larges de 1,5-4,5 cm. Bractées longues de 10-14 mm., larges de 2-2,5 mm.; bractéoles longues de 6 mm., larges de 2 mm.; sépales longs de 5 mm.; corolle longue de 14 mm.; capsule longue de 7-8 mm.

Yunnan : vallée du Lao oua tan (alt. 600 m.); plante vivace en touffes, fleurs bleues, octobre (R. P. Maire).

Rungia Pierrei nov. sp.

Herba caulibus diffusis, ad nodos geniculatis, teretibus, glabris. Folia petiolata, oblonga, ad basim acuta, ad apicem breviter acuminata, obtusiuscula, glabra. Flores spicati; spicæ sæpe ad basim ramosæ, axillares et terminales in paniculam congregatæ. Bractæ oppositæ, oblongæ, oblusæ, apice aliquando mucronato, margine scarioso, una sterilis basi lata axi longitudinaliter adnato, altera fertilis, ad basim coangustata, sessilis. Bracteolæ duæ oblongæ, ad basim attenuatæ, sub calice insertæ. Sepala quinque linearia, minute puberula, ad basim connata. Corollæ tubus cylindricus, labium inferius trilobum, superius triangulare, apice truncato. Stamina duo ad faucem inserta, antheræ loculis uno altero altius affixæ, ad basim calcaratis. Capsula pubescens.

Bulletin du Muséum, 2^e s., t. II, n^o 1, 1930.

Feuilles longues de 6-15 cm., larges de 1,5-6,5 cm.; bractées longues de 5 mm., larges de 2 mm.; bractéoles longues de 4 mm.; sépales longs de 4 mm.; corolle longue de 10 mm.; capsule longue de 6 mm.

Cochinchine : ad montem Deon ba prope Tayninh.

Dicliptera Mairei nov. sp.

Suffrutex ad basim repens, ramis junioribus subtetragonis sparse pilosis, deinde glabris. Folia petiolata, ovata, ad basim acuta, ad apicem breviter acuminata, sparse pilosa. Flores in cymis axillaribus glomerulatis. Bractæ inflorescentiæ ramos axillantes lineares, acutæ, sparse pilosæ. Involucri bractæ inæquales ovatæ, ad basim subacutæ, ad apicem breviter acuminatæ, albo-pilosæ, præsertim ad basim. Bracteolæ lineares, acutæ, sparse pilosæ. Calicis segmenta linearia, fere ad basim libera, pilis sparsis raris vestita. Corollæ tubus cylindricus, labium posticum ovale, anticum tritobum, lobis medio latiore, lateralibus angustioribus. Stamina duo ad faucem inserta, loculis antherarum brevibus, uno altero altius affixo. Ovarium parce et breviter pilosum; stylus glaber. Capsula ignota.

Feuilles longues de 2-5 cm., larges de 12-25 mm.; bractées accompagnant les ramifications de l'inflorescence longues de 1 cm., larges de 1 mm.; bractées de l'involucre, l'une longue de 14-15 mm., large de 8-9 mm., l'autre longue de 9-10 mm., large de 5 mm.; bractéoles longues de 5 mm. Calice long de 5 mm.; corolle longue de 2 cm.

Yunnan : cultures de Pa eul gai (alt. 700 m.); plante annuelle, rameuse, rampante, fleurs roses (R. P. Maire).